




Grafische presentatie van de onderzoeksresultaten van VGO UGO over het risico op longontsteking binnen 2 km van een geitenhouderij


Opmerking: Het exacte verloop van het aantal gevallen van longontsteking binnen de 2 km zone *is niet bekend. Deze presentatie leent zich daarom niet voor curve fitting!*

Uit de meta-analyse van VGO UGO blijkt dat het aantal gevallen van longontsteking toeneemt als de afstand tot de geitenhouderij kleiner wordt. Zonder veehouderij is het aantal gevallen van longontsteking circa 1400 per 100.000 inwoners per jaar (getrokken lijn). Op 1000 m vanaf een geitenhouderij is het aantal gevallen van longontsteking 20% hoger en op 500 m 70% hoger dan de baseline van 1400 gevallen per 100.000 inwoners.

Ziekenhuisopnamen voor longontsteking en acute bronchi(oli)tis 2018



Aantal opnamen per 1.000 inwoners



Bron: [Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg](#) (gedownload van CBS StatLine in april 2020)

- [ICD-10-codes: A48.1, J12-J18, J69.0 \(longontsteking\) en J20-J22 \(acute bronchi\(oli\)tis\)](#)
- *Cijfers zijn voorlopig*